

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e teve origem em 2019. Tornou-se pandémica e já causou muitas infecções e elevada mortalidade. Actualmente existe vacina contra esta doença que previne o aparecimento de sintomas de doença grave em infectados.

Vacinação contra a COVID-19 em crianças e adolescentes:

Fonte: CDC - Centers for Disease Control and Prevention (EUA)

(Centros de Controlo e Prevenção de Doenças)

(Ver documento original [AQUI](#) - atualizado em 11 de Janeiro de 2022)

Autorizado para	Pfizer-BioNTech	Moderna	J&J / Janssen
≤ 4 anos	Não	Não	Não
5-11 anos	Sim	Não	Não
12-17 anos	Sim	Não	Não
≥ 18 anos	Sim	Sim	*

* Todas as pessoas com 18 ou mais anos devem receber uma dose de reforço de Pfizer-BioNTech ou Moderna (vacinas mRNA COVID-19) pelo menos 2 meses após receberem a vacina Johnson & Johnson Janssen (J&J/Janssen) na maioria das situações (Ver [AQUI](#)).

→ Recomendações:

- O CDC recomenda que **todas as pessoas com 5 ou mais anos de idade sejam vacinadas contra a COVID-19**
- Há uma dose de reforço para crianças menores de 12 anos. Numa situação normal o intervalo é de 6-8 semanas. Numa criança que entretanto teve infeção, a 2ª dose deve ficar adiada no mínimo por 3 meses.
- Todas as pessoas com 12 ou mais anos de idade devem receber uma dose de reforço contra a COVID-19.
- Adolescentes com idade entre 12 e 17 anos devem receber a dose de reforço Pfizer-BioNTech COVID-19 pelo menos 5 meses após completar a vacinação primária Pfizer-BioNTech COVID-19

→ **Por recomendação do Dr. João Passos, neurologista, oncologista do IPO Lisboa e especialista nas doenças raras Neurofibromatoses**, a vacinação é considerada prioritária para crianças sob quimioterapia convencional ou dirigida, e está contra-indicada em crianças com reacções alérgicas prévias, imunodeprimidas ou com doença auto-imune.

→ Ajude a proteger o seu filho, a sua família e outras pessoas

Ser vacinado contra a COVID-19 pode ajudar a proteger crianças com 5 ou mais anos de idade da infecção por COVID-19:

- A vacinação de crianças pode ajudar a proteger os elementos da família, incluindo irmãos que não são elegíveis para a vacinação, e/ou familiares que podem estar em maior risco de ficarem muito doentes se estiverem infectados (Ver [AQUI](#)).
- A vacinação pode evitar que as crianças com a doença COVID-19 fiquem gravemente doentes.
- Vacinar crianças de 5 ou mais anos de idade pode ajudar a mantê-las na escola e a participar em segurança em actividades desportivas ou outras actividades em grupo.

→ Após a vacinação do seu filho contra a COVID-19

O seu filho pode ter alguns efeitos colaterais/secundários (Ver [AQUI](#)), que são sinais normais de que o seu corpo está a criar uma protecção/resposta imune.

**No braço em que o seu filho
recebeu a injeção pode ocorrer:**

- Dor
- Vermelhidão
- Inchaço

No resto do corpo:

- Cansaço
 - Dor de cabeça
 - Dor muscular
 - Arrepios
 - Febre
 - Náusea
-

→ Perguntas frequentes sobre a vacinação contra a COVID-19 em idade pediátrica:

VER [AQUI](#) (em português); VER [AQUI](#) (em inglês)

[VACINA PARA COVID-19 EM IDADE PEDIÁTRICA E LESÃO CARDÍACA: O QUE SABEMOS.](#) (Em conclusão, a vacinação contra o vírus SARS-CoV-2 é segura e eficaz em idade pediátrica. As reacções adversas são raras, muito em particular no grupo de crianças entre os 5 e os 11 anos. A miocardite após vacinação é muito rara e geralmente ligeira, com rápida recuperação, parece não ter sequelas, e atinge particularmente rapazes na adolescência e jovens adultos)